



PROSPECTO;Error! Marcador no definido.

Dorival®

IBUPROFENO

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene: Ibuprofeno (D.C.I.), 200 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, almidón de maíz, silice coloidal anhidra, estearato de magnesio, hipromelosa, macrogol 4000 y dióxido de titanio (E-171).

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Comprimidos.

Envase con 12 y 18 comprimidos.

ACTIVIDAD

Ibuprofeno es eficaz para reducir el dolor y la fiebre.

TITULAR

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5 -08970-
Sant Joan Despi (Barcelona)

FABRICANTE

Kern Pharma, S. L.
Venus 72, Pol. Ind. Colon II
08028 Terrasa (Barcelona)

INDICACIONES

Alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, menstruales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbalgia). Estados febriles.

CONTRAINDICACIONES

Alergia al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de esta especialidad. Los pacientes con úlcera gástrica o con tratamiento médico de cualquier otra enfermedad de estómago, no deben utilizar este medicamento.



El ibuprofeno está contraindicado en pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos; tampoco debe administrarse en pacientes que padecen o hayan padecido asma, rinitis o urticaria.

PRECAUCIONES

No exceder las dosis recomendadas en la posología.

En pacientes que han sufrido enfermedades gástricas o intestinales (ej.: úlcera) no se debe administrar este medicamento, excepto bajo supervisión médica. No debe tratarse el dolor de estómago e intestinal con este medicamento.

Si al tomar el medicamento nota ardor o dolor de estómago, debe suspender el tratamiento y consultar al médico. Si sufre otra enfermedad o si padece algún tipo de alergia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar el medicamento.

Si el dolor se mantiene durante más de 10 días o la fiebre durante más de 3 días, se debe consultar al médico.

Si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

INTERACCIONES

No se debe utilizar con otros analgésicos sin consultar al médico.

La administración de ibuprofeno puede potenciar el riesgo de hemorragia digestiva durante el tratamiento concomitante con corticoides o consumo simultáneo de alcohol.

Los pacientes en tratamiento continuo con otros medicamentos deben consultar al médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

ADVERTENCIAS

La utilización de ibuprofeno en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas –cerveza, vino, licor,...- al día) puede provocar hemorragia de estomago.

Las personas con hipertensión, con la función renal, cardíaca o hepática reducidas, con alteraciones en la coagulación sanguínea o que estén en tratamiento con anticoagulantes, deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.

Embarazo y lactancia

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de utilizar este medicamento.

¡Error! Marcador no definido.IMPORTANTE PARA LA MUJER



Si está Vd. embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

Aunque no son de esperar efectos en este sentido, debe utilizarse con precaución si nota somnolencia o mareos.

Uso en ancianos

Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a sus efectos, por lo que a veces deben reducir la dosis. Consultar al médico.

Uso en niños

No administrar a menores de 12 años sin consultar al médico.

POSOLOGIA

Los adultos y niños mayores de 12 años tomarán 200 mg (1 comprimido) cada 4 ó 6 horas mientras persistan los síntomas.

No se tomarán más de 6 dosis de 200 mg (1200 mg) al cabo de 24 horas (1 día).

En adultos si el dolor o la fiebre no responde a dosis de 200 mg puede aumentarse a 400 mg (2 comprimidos).

Usar siempre la dosis menor que sea efectiva.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO

Tomar el medicamento con las comidas o con la leche, principalmente si se notan molestias digestivas.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico inmediatamente o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

En alguna ocasión puede producirse náuseas, dolor o ardor de estómago o erupción cutánea, que desaparecen con la interrupción del tratamiento.



En el caso de presentarse síntomas anormales (hemorragia, edemas o hinchazón), o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Condiciones normales. Mantener en su envase original.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

TEXTO REVISADO: junio 2004

Dorival – P.E/01