



PROSPECTO

NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

NUROFEN 400 mg Comprimidos recubiertos

COMPOSICION

Por comprimido:

Ibuprofeno (DCI) 400 mg. Excipientes: Almidón de maíz, almidón de maíz desecado, ácido esteárico, almidón de maíz pregelatinizado, dióxido de silicio anhidro coloidal, agua purificada, opaglos regular, acacia, sulfato de calcio dihidratado, carboximetilcelulosa sódica, sacarosa (295,8 mg), blanco opalux AS 700, cera carnauba, Rojo opacode S-19005 HV.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Comprimidos recubiertos en envases de 12 a 24 comprimidos.

ACTIVIDAD

Ibuprofeno es eficaz para reducir el dolor y la fiebre.

TITULAR

Boots Healthcare, S.A.
Dr. Zamenhof, 36, 2ª planta
28027 Madrid

FABRICANTE

Boots Healthcare Int. Ltd.
Nottingham, England

INDICACIONES

Alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, menstruales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbago). Estados febriles.

CONTRAINDICACIONES

Alergia al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.
Los pacientes con úlcera gástrica o con tratamiento médico de cualquier otra enfermedad de estómago, no deben utilizar este medicamento.
El Ibuprofeno está contraindicado en pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos, tampoco debe administrarse en pacientes que padecen o hayan padecido asma, rinitis o urticaria.

PRECAUCIONES

No exceder las dosis recomendadas en la posología.



En pacientes que han sufrido enfermedades gástricas o intestinales (ej.: úlcera) no se debe administrar este medicamento, excepto bajo supervisión médica. No debe tratarse el dolor de estómago e intestinal con este medicamento.

Si al tomar el medicamento nota ardor o dolor de estómago, debe suspender el tratamiento y consultar al médico. Si sufre otra enfermedad o si padece algún tipo de alergia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar el medicamento.

Si el dolor se mantiene durante más de 10 días o la fiebre durante más de 3 días, se debe consultar al médico.

Si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen estos u otros síntomas, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

INTERACCIONES

No se debe utilizar con otros analgésicos, sin consultar al médico.

No administrar ibuprofeno con productos que puedan dañar el estómago (alcohol, corticosteroides).

Los pacientes en tratamiento continuo con otros medicamentos deben consultar al médico o farmacéutico antes de tomar éste o cualquier otro medicamento.

ADVERTENCIAS

La utilización de ibuprofeno en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas – cerveza, vino, licor,...- al día) puede provocar hemorragia de estómago.

Las personas con hipertensión, con la función renal, cardíaca o hepática reducidas, con alteraciones en la coagulación sanguínea o que estén en tratamiento con anticoagulantes, deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.

Embarazo y lactancia:

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de utilizar este medicamento.

Importante para la mujer: Si esta embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto y debe ser vigilado por su médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción:

Aunque no son de esperar efectos en este sentido, debe utilizarse con precaución si nota somnolencia o mareos.

Uso en ancianos:



Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a sus efectos, por lo que a veces deben reducir la dosis. Consultar al médico.

Uso en niños:

No administrar a menores de 18 años sin consultar al médico.

POSOLOGIA

Vía oral:

Adultos.

Se tomará un comprimido cada 6-8 horas mientras persistan los síntomas. No tomar más de 3 comprimidos (1200 mg) cada 24 horas.

Ancianos.

La posología debe ser establecida por el médico, ya que cabe la posibilidad de que se necesite una reducción de la dosis habitual.

Pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardíaca: Reducir la dosis y consultar al médico.

Usar siempre la dosis menor que sea efectiva.

La administración del preparado está supeditada a la aparición del dolor o la fiebre. A medida que estos desaparezcan, debe suspenderse la medicación.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Tomar el medicamento con las comidas o con leche, principalmente si se notan molestias digestivas.

Disolver el contenido de un sobre en medio vaso de agua.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico inmediatamente o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

En alguna ocasión puede producirse náuseas, dolor o ardor de estómago o erupción cutánea que desaparecen con la interrupción del tratamiento.

En el caso de presentarse síntomas anormales (hemorragia, edemas o hinchazón) o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.



CONSERVACIÓN

Consérvese en lugar fresco y seco y a temperatura inferior a 25° C.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TEXTO REVISADO:

Noviembre 1999.